Canal carpien: Techniques Indications, résultats, complications

Christian Dumontier

Institut de la Main & hôpital saint Antoine, Paris

Historique

- ✦ 1853: Sir James Paget
- ✦ 1880: Putnam
- ✦ 1913: Marie & Foix

- ✦ 1924 Galloway (ou 1933 Learmonth)

- ✦ 1987: Okutsu
- ✦ 1989: Okutsu (37 cas), Chow (64 cas)
- ✦ 1992: Agee

J'ai commencé en 1992 avec une technique à deux voies d'abord

Anatomie

- 25 mm large, 30 mm de long

Anatomie

- Fréquence des variations anatomiques (20%)
- Sans influence sur les techniques chirurgicales
 - Anomalies du nerf médian
 - Anomalies du contenu

Epidémiologie

- ✦ Incidence: 0,1 à 0,3 %
- ✦ Prévalence 3-16%
- ✦ Age moyen 45-50 ans, 3-5 ♀ / 1 ♂
- ✦ 100,000 interventions / an (France)

Questions pratiques

- ✦ Ce n'est pas un canal carpien / ce n'est pas seulement un canal carpien
- ✦ C'est un canal carpien
 - ✦ Bilan étiologique / examens complémentaires ?
 - ✦ Traitement médical ?
 - ✦ Quand doit-on opérer ?

Clinique

- ✦ Acroparesthésies nocturnes (et de maintien d'attitude le jour) +/- douleur
- ✦ Nécessité de secouer la main
- ✦ Bilatéral (1/3)
- ✦ Surtout 3/4 doigt, territoire du médian, main pouvant remonter à l'épaule

Examen clinique

- Nombreux signes décrits
- Spécificité et sensibilité moyenne

Test	Se	Sp
Phalen	0,33-1	0,1-0,91
Tinel	0,48-1	0,14-0,86
Compression	0,29-1	0,23-1
Garrot	0,44-0,9	0,2-0,97
Lombricaux	0,93	0,97
Flexion-Compression	0,99	0,82

Ce n'est pas comme d'habitude !

- ✦ Ce n'est pas seulement un canal carpien

- ✦ Double crush syndrome
- ✦ Atteinte médio-ulnaire

- ✦ Ce n'est pas un canal carpien

- ✦ NCB

- ✦ TOS

- ✦ Maladies neurologiques (SLA, SEP,...)

Orientations cliniques

Le diagnostic étiologique

- ★ N'est pas réellement un problème pratique (pour le chirurgien)
- ★ Idiopathique
- ★ Diabète I (6X), II(4X)
- ★ Grossesse
- ★ Obésité
- ★ Synovites « inflammatoires »;
M. de surcharge
- ★ Insuffisance rénale (fistule,
névrite, amylose)
- ★ Insuffisance thyroïdienne
- ★ Trauma (FER, Luxation R
°carpienne, intra-carpienne,
immobilisation,...)
- ★ Acromégalie
- ★ Hémopathies
- ★ Tumeurs
- ★ Intoxication (β -, Li,
ergotamine)
- ★ Carences vitaminiques (B6)

Canal carpien et maladie professionnelle (tableau 57)

- ✦ Falkiner (64 articles)
 - ✦ Travail moins en cause que le terrain / conditions physiques individuelles
- ✦ Abbas (17 articles)
 - ✦ Travail en force et répétition peut être en cause

Le travail sur clavier N'EST PAS une cause de canal carpien

Examens complémentaires

- ✦ Radiographie du poignet / du canal carpien (Bof !)
- ✦ Echographie (Dg et étiologique)
- ✦ Scanner: NON
- ✦ IRM : non, sauf reprise, causes rares
- ✦ Biologie : NON

EMG

- ✦ Très opérateur (et T°)-dépendant
+++
- ✦ Peut être normal (⇒ 20%)
- ✦ Stimulodétection
 - ✦ Latence distale LDM > 3,5 ms LDS > 2,2 ms
 - ✦ Vitesse conduction VCS < 50 ms
- ✦ Détection
 - ✦ Fibrillation de repos + potentiels polyphasiques (dénervation)

Faut-il demander un EMG ?

- ✦ Pour dépister des lésions associées (nerf ulnaire)
- ✦ Pour rechercher une lésion nerveuse associée (polyneuropathie)
- ✦ Pour rechercher des signes de gravité (dénervation, perte axonale)
- ✦ Élément de preuve de l'absence de lésion per-opératoire

et aussi, pour confirmer le diagnostic

Le traitement médical

- ✦ Beaucoup de traitements proposés, peu de validés
- ✦ Mérite d'être essayé
 - ✦ Evolution spontanée vers guérison ?
 - ✦ Coût (4X moins)
 - ✦ Efficace (?) sur cas précoces
 - ✦ Valeur prédictive de la Chirurgie

EBM: efficacité < 6 mois

- ❖ AINS
- ❖ AIS p.o/infiltration (+ au début 25-92%, puis 4-40%)
- ❖ Vitamine B6
- ❖ Attelle ← EBM: efficacité < 1 mois
- ❖ US, ionophorèse
- ❖ Ergonomiques
- ❖ Exercices (glissement nerf, tendon, yoga, stretching,...)
- ❖ Ostéopathie, Acupuncture

Technique infiltration

A travers le FCR,
orienté à $45^{\circ}/45^{\circ}$

=

pas de risque, pas de
douleurs

Le traitement chirurgical

- ✦ Holmgren (1985) montre que la neurolyse intra-fasciculaire est inutile
- ✦ Schuind (1990) montre que la synovectomie est inutile
 - ◆ (plus remboursée à partir de 1995)
- ✦ La section isolée du retinaculum est donc la seule technique validée

Que pensez de l'atteinte associée du nerf ulnaire au Guyon ?

✦ RIEN

✦ Atteinte électrique du nerf ulnaire au Guyon dans 25 % des cas

✦ Qui disparaît après le traitement du canal carpien

L'atteinte du nerf ulnaire au Guyon relève d'un tout autre mécanisme

Techniques chirurgicales

- Ciel ouvert
 - Libération isolée
 - Plasties du LRA
 - Mini-open
- ✱ Endoscopique
✱ 2 voies / 1 voie
✱ Proximale / Distale
- « Intermédiaires »

Endoscopie sans endoscope

Techniques avec transillumination

Conditions habituelles

✦ Ambulatoire

✦ Anesthésie

- ◆ Loco-régionale

- ◆ Locale

✦ Garrot pneumatique

✦ Pansement, pas d'ATB

✦ Mobilisation immédiate des doigts, pas de rééducation

✦ Utilisation rapide de la main

Reconstruction du retinaculum

Mini-incisions

Les techniques endoscopiques

- ✦ Justifiées: la section du retinaculum est le seul geste indispensable
- ✦ Avantages: limitent la rançon cicatricielle, les douleurs post-opératoires, la gêne fonctionnelle, le manque de force,...
- ✦ Inconvénients: les difficultés techniques, le coût +++

En chirurgie, on ouvre le
retinaculum et l'aponévrose
palmaire superficielle

Les techniques endoscopiques

✦ Une voie d'abord

◆ Proximale

◆ Distale

✦ Deux voies d'abord

Techniques à deux voies

Techniques à deux voies

Comment réussir une libération endoscopique ?

- ✦ Installation
 - ✦ Toujours dans l'aisselle du patient

Hamulus hamatum

Incision (1)

- 1 cm de long
- Jamais radial au palmaris longus
- Pas trop ulnaire
 - Le Guyon chevauche le canal carpien de 28%

Incision (1)

- 1 cm de long
- Jamais radial au palmaris longus
- Pas trop ulnaire
 - Le Guyon chevauche le canal carpien de 28%
 - L'orientation du CC est radiale

Incision (2)

- ✦ 1 cm de long
- ✦ Au niveau du pli proximal du poignet
 - ✦ car le CC a un aspect en diabolo longitudinalement

Incision (3)

- ✦ Dissection longitudinale au ciseau jusqu'au ligamentum carpi volare
- ✦ Dissection transverse du carpi volare qui est tenu par un écarteur

Introduction de la rugine

- La rugine est utilisée pour libérer le retinaculum de la synoviale
- Il faut commencer en proximal pour ne pas tirer sur la synoviale qui tient le nerf

Dilatation (inutile ?)

Introduction du couteau

- ✦ Tenir le couteau comme une rugine
- ✦ Ne pas mettre le poignet en hyperextension
 - ✦ Sentir le contact avec le rétinaculum
 - ✦ On descend le couteau jusqu'à entrer dans le canal
 - ✦ ON pousse doucement jusqu'au bord distal

Section du retinaculum

- ✦ Ne pas essayer d'être distal au ligament (l'arcade vasculaire est à 4 mm en distal)

Section du retinaculum

- ✦ On sectionne seulement 1 cm. Cela empêche que le nerf ne tombe dans l'incision
- ✦ On contrôle ensuite et comme la partie distale est plus épaisse que la lame, on recoupe jusqu'à être sur (les deux berges doivent être parallèles)

Section du retinaculum (2)

- ✦ On termine de couper le retinaculum
- ✦ Réintroduction du couteau et controle
 - ✦ Deux berges du retinaculum
 - ✦ Le nerf médian
 - ✦ Ses variations

Fin de l'intervention

- Stéristrips
- Gros pansement pour 4/5 jours
- Après la 1ère consultation, les patients sont autorisés à utiliser leurs mains sans limitation (douleur)

Résultats (Dubert)

- 217 patients: **91,2 % satisfied** (12,4% still have some paresthesiae, 3,7% persistent pain). Mean DASH 13,2
- Most endoscopic series report **95% of good to excellent** results
 - **72% symptoms-free** at 4 years (complaining of pain of other origin [neck],...)
 - **74% complaining** at 5,5 years with open technique (Haupt, Kulick, Nancollas)

Les moins bons résultats sont associés à:

- Un déficit moteur ou sensitif pré-opératoire, le plus souvent corrélé à une longue évolution
- Hypersensibilité à la douleur (fibromyalgie)
- L'existence d'une procédure judiciaire
- Plusieurs sites de compression
- Patient avec une neuropathie, y compris les diabétiques
- Patient avec problème psychologique
- Patients dont le CC est reconnu en maladie professionnelle
- Patients avec une EMG pré-op normal (ou presque)
- Patients avec plusieurs facteurs négatifs !

Complications

- ✦ **1508 cases** over a 6 months period: 11 reflex sympathetic dystrophy (0,72%), 2 superficial infection (0,13%), 9 paresthesiae (0,59%), and various pillar pain or other minor complications (2,38%).
- ✦ **2223 CTS**: 32 patients with dysesthesiae, 16 pillar pain, 2 reflex sympathetic dystrophy (0,09%) and 3 lesion of the palmar cutaneous branch of the median nerve (2 resolved)
- ✦ **Eder** : no complications (100 cases)
- ✦ **Chow** : 2700 cases without major complications, 2 transient ulnar nerve palsies and one superficial infection (0,11%).

CASE

Comparaison avec les techniques à ciel ouvert ?

- ✦ Boeckstyns (JHS 1999)
- ✦ Scholten (Cochrane 2007)
- ✦ Thoma (PRS 2004)

- ✦ Benson (Arthroscopy 2006)

Pas de
différence entre
les techniques

Endoscopie
plus sûre !

Autres comparaisons

- ✦ Les techniques endoscopiques sont moins chères pour la société (retour plus précoce au travail chez les 40-60% de patients en activité)
 - ✦ Le temps d'occupation de salle est plus court (240 € vs 346 € - Pajardi)
- ✦ Les études de type QALY ont montré un bénéfice des techniques endoscopiques par rapport aux techniques à ciel ouvert

Indications

- ✦ Quelles sont les contre-indications ?
 - ✦ Pathologie (lésions intra-canaliaires, synovite,...)
 - ✦ Patient (absence d'extension, anomalies du médian)

Lésions intra-canalaires

- ✦ Anomalies musculaires:
 - ✦ Très fréquentes (Lombricaux, corps musculaires du FCS index, Palmaris longus)
 - ✦ Sans incidence, ce ne sont pas des c/i
- ✦ Tumeurs, lésions osseuses (Kienböck,...)

Quels sont les canaux carpiens qui présentent une anomalie musculaire ?

- ✦ Clinique
 - ✦ Sujet jeune
 - ✦ Pas de pathologie synoviale ou métabolique
 - ✦ Pas de traumatisme du poignet
 - ✦ Signes lors de l'utilisation de la main
 - ✦ Pas de recrudescence nocturne
 - ✦ Palpation d'une tuméfaction anormale
- ✦ Imagerie: IRM [Schuuman 00, Zeiss 95]

Anomalies du médian

- Rameau thénarien: (<1% bord ulnaire)
- Rameau trans-ligamentaire: 7-9% (Kozin, Tountas)
- Compression isolée de la branche motrice

Contre-indications

- ✦ Absence d'extension possible de 20-30°
- ✦ Troubles de la coagulation
- ✦ Infection intra-canalaire
- ✦ Tumeurs du médian

Contre-indications (relatives)

- ✦ Atrophie thénarienne isolée
- ✦ ATCD de chirurgie des fléchisseurs ou cicatrice intra-canalaire
- ✦ Hyperplasie synoviale (PR, hémodyalisés)
- ✦ Patients avec des petites mains (ou cal vicieux du radius)
- ✦ Anomalies intra-canalaire

Contre-indications ?

- ✦ **Synovite ?**: Les patients avec une synovite majeure (PR, hémodyalysés) doivent avoir une synovectomie (pas un CC à ciel ouvert). Les patients avec une synovite modérée peuvent être traités endoscopiquement
- ✦ **Lésions intra-canaliaires ?**: Si suspecté en pré-op, ciel ouvert. Très rare dans notre expérience
- ✦ **Variations nerveuses ?**: l'endoscopie est probablement plus sûre (le nerf est vu avant de couper le retinaculum, pas après)

Hypothèses diagnostiques devant la persistance ou la récurrence des symptômes après TTT chirurgical

- Etude rétrospective de 131 poignets

Réintervention ?

- Suivi moyen: 11 ans

- Facteurs prédictifs négatifs:

- EMG préopératoire normal

- Douleurs préopératoires associées dans le territoire du n. cubital

- Prise en charge dans le cadre d'une MP ou AT

⇒ **Mauvais résultats postopératoires**

Indications et contre-indications ?

- Il n'y a pas beaucoup de contre-indications médicales

Les limites actuelles de l'endoscopie sont
celles de la chirurgie

Il vaut mieux connaître l'adresse d'un bon
chirurgien que celle d'un mauvais

- ✦ Canal carpien à ciel ouvert
 - ✦ Simple, efficace, sûr, transmissible....
- ✦ Evolution vers le traitement endoscopique ?
 - ✦ Amélioration du confort immédiat
 - ✦ Accélération de la récupération
 - ✦ Réduction de l'arrêt de travail
 - ✦ Coût global moindre
 - ✦ Demande des patients

Moins, c'est mieux ?