Pathologie de la sterno-claviculaire

Christian Dumontier: Institut de la Main & hôpital saint Antoine, Paris

Marc Soubeyrand: hôpital du Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Philippe Moreel: hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand

Plan 30 mn

- ✦ Rappel anatomie et imagerie
- ✦ Pathologies médicales & chirurgicales
- ✦ Pathologies chirurgicales 10

Anatomie & imagerie

- ✦ Les structures osseuses
- ✦ Les moyens d'union ligamentaires et leur rôle
- ✦ Les muscles alentours

Structures osseuses

- ✦ Di-artrodié
- ✦ Manubrium sternal
- ✦ Clavicule
- ✦ Bord supérieur du 1er cartilage costal

Imagerie simple = difficile

- ✦ Superposition de nombreuses structures
- ✦ Clichés de débrouillage (hémopneumothorax ?)
- ✦ Plusieurs incidences (Hobbs 1968, Heinig 1968, Serendipity 1970)

Incidence de Heinig

- ✦ Patient allongé en position de nageur
- ✦ Bras normal le long du corps
- ✦ Bras à radiographier relevé au-dessus de la tête,
- ✦ Tube placé à 75 cm de la sternoclaviculaire,

Analyse difficile !

Serendipity view

- ✦ Patient allongé
- ✦ Rayon incliné de 40° vers la tête, centré sur le manubrium

Le scanner

- ✦ Examen de choix
- ✦ Coupes fines (reconstruction)
- ✦ Attention aux variations anatomiques liées à l'âge (arthrose) et à l'ossification tardive du noyau épiphysaire (> 20 ans)

Y246

Osselets surnuméraires

Pas de stabilité intrinsèque

- ✦ Clavicule 2 x plus grosse que la surface sternale
- ✦ Articulation en selle (concave d'avant en arrière; convexe de haut en bas)
- ✦ La moins stable des grosses articulations du corps !

Les ligaments: le ménisque

- Epais 3-5 mm,
- Sépare l'articulation en 2 compartiments
- Visible en IRM

Ménisque

- ✦ R= 1ère cote
- ✦ 3= ménisque
- ✦ 4= capsule

Ligaments costoclaviculaires

- ✦ Très épais (2x 1,5 x 1 cm).
- ✦ 2 faisceaux séparés par une bourse séreuse.
- ✦ Insertion à 1 cm de l'interligne.

Ligaments costoclaviculaires

- ✦ La fossette d'insertion profonde (30% des cas) peut être confondue en imagerie

Ligaments costoclaviculaires

- Visibles en IRM (n° 6)

7: subclavius 11: pectoralis major

Ligament interclaviculaire

- ✦ Equivalent du wishbone
- ✦ Parfois palpable

- ✦ 3 = ménisque
- ✦ 4 = capsule
- ✦ 5 = Ligament interclaviculaire

Les ligaments sterno-claviculaires antérieur et postérieur

- ✦ Renforcement capsulaire

L'IRM

- ✦ Bonne analyse de l'anatomie en T1 spin-écho
- ✦ Difficultés: caractère courbe des surfaces articulaires
- ✦ Moelle graisseuse et non pas hématopoïétique
- ✦ Liquide articulaire souvent présent à l'état physiologique
- ✦ Intérêt en traumatologie ?

- ✦ SALTER II
- ✦ Rupture lgt SC postérieur (flèche)

- ✦ Déplacement postérieur
- ✦ Déplacement de la veine brachiocéphalique gauche (LBV)

39 ans, traumatisme SC droit

- Lgt interclaviculaire intact
- Déchirure du ménisque (flèche)
- Déchirure du lgt sternoclaviculaire supérieur (pointe de flèche)
- Déchirure du ménisque gauche (flèche) et absence à droite
- Subluxation

19 ans, salter II gauche

- Ménisque absent à gauche
- Hypersignal lié à l'hémarthrose
- Oedème intra-osseux clavicule
- Absence de ménisque

Les muscles

- ❖ Pas de rôle dans la stabilité
- ❖ Sternocléïdomastoïdien
- ❖ Trapèze
- ❖ Sterno-hyoïdien, sterno-thyroïdien
- ❖ Scalènes
- ❖ Subclavius
- ❖ Pectoralis major

Na pas oublier !

- ✦ Les structures intra-thoraciques en arrière
- ✦ Tronc artériel innominé, veine innominée, nerf pneumogastrique, veine jugulaire interne, trachée, oesophage, crosse de l'aorte, veine cave supérieure, artère pulmonaire droite,...

Physiologie

- ✦ Petit mais costaud
- ✦ Seule articulation qui relie le membre supérieur au tronc !
- ✦ Sollicitée dans tous les mouvements de l'épaule

Physiologie

- ✦ Pied de mat d'une planche à voile
- ✦ Mat = clavicule-scapula,
- ✦ Voile = bras

Mouvements

- ✦ Élévation-abaissement 30-35°
- ✦ Antépulsion-rétropulsion 30-35°
- ✦ Rotation axiale 25-45°

ELEVATION-ABAISSEMENT

ANTEPULSION-RETROPULSION

ROTATION AXIALE

Pathologies médicales

- ✦ Nombreuses
- ✦ Rares
- ✦ Souvent dans le cadre de pathologie générale

Arthrose

- ✦ F= M
- ✦ > 40 ans
- ✦ Bilatéral
- ✦ Travailleur manuel, chirurgie radicale du cou, post-ménopause

Arthrose

Infection tuberculeuse

Luxation atraumatique

- ✦ 10-30 ans
- ✦ Unilatéral
- ✦ Laxité +++

Autres

	Age	Sexe	Douleur	Coté	Facteurs associés	Biologie	Imagerie
Arthrite rhumatoïde	Indif.	F>M	+	B		Facteurs rhumatoïdes	Modifications mineures
Spondylarthropathie séro-négative	< 40	M>F	parfois	B	urétrite, uvéïte	HLAB27+	Discrètes
Chondrocalcinose	>40	M>F	+++	U	autres atteintes	CBRF+/-	calcifications PM
Hyperostose	30-60	M>F	+	B	synovite, acné, pustulose, ostéïte	Nle	hyperostose, ossifications ligaments
Ostéïte condensante	25-40	F>M	+	U	Aucun	Nle	épaiss. bord medial clavicule
Ostéonécrose	Indif.	F>M	+	U	Aucun	Nle	irrégularités bord médial
Autres							

SAPHO

Pathologies traumatiques

- ✦ Fracture du 1/4 interne de la clavicule
- ✦ Fracture du manubrium
- ✦ Décollement épiphysaire (< 23 ans)
- ✦ Entorses et luxations

Epidémiologie

- ✦ 1 à 3% des traumatismes de l'épaule
 - ✦ AVP (47%)
 - ✦ Accident sportif (31%)

Mécanisme

- ✦ Choc direct (30%)
- ✦ Compression des épaules
 - ✦ Luxation antérieure
 - ✦ Luxation postérieure
- ✦ Ratio ant/post = 20/1

Luxation postérieure

- ✦ Rare $\approx$ 200 cas publiés
- ✦ Grave: 30% complications dont 7% décès !
- ✦ Diagnostic initial difficile $\Leftrightarrow$ Scanner facile
- ✦ Urgence chirurgicale (bloc, avec un vasculaire)

48% sont diagnostiquées en urgence ; 30% dans la première semaine, 11% dans le 1^{er} mois et 11% au-delà

Luxation antérieure

- ✦ Diagnostic plus facile
- ✦ Moins d'urgence
- ✦ Pas de complications
- ✦ Récidive après réduction +++

La réduction

Les lésions passées inaperçues

- ❖ Découverte par des complications ++
++
- ❖ Réduction et fixation chirurgicale

Techniques

- ✦ Pas vraiment codifiées
- ✦ Reconstruction du ligament costo-claviculaire (Burrows) et/ou sterno-claviculaire
- ✦ Souvent résection du cm médial de la clavicle pour permettre la réduction

Technique de Burrows

Technique de Burrows

Reconstruction du ligament sternoclaviculaire

Conclusion

- ✦ Pathologie peu fréquente mais à connaître
- ✦ Intérêt majeur de l'imagerie (scanner, IRM) pour le diagnostic
- ✦ Les risques chirurgicaux expliquent le peu d'enthousiasme des chirurgiens pour cette pathologie