Technique d'amputation d'une phalange ou d'un doigt

Thierry Dubert

Principes généraux

- Réduire le préjudice fonctionnel
 - Pince fine
 - Force globale
- Réduire le préjudice esthétique
- Favoriser le port d'une prothèse

jours

Plasticité cérébrale visible en 10

Plan

- Les principes techniques
- Particularités en fonction du niveau
- Particularités en fonction du doigt
- Stratégie opératoire

Stratégie d'amputation digitale pour tumeur :

- Un seul doigt

Quel niveau?

- Palliatif (métastases) ,
ou
- Marge de sécurité 3 à 5 cm ?

Dessin cutané

- Valve dorsale courte et ovale « unguéale »
- Valve palmaire plus longue (5 mm) « pulpaire »

Temps opératoires

- Ligature des 2 artères
 - Sections nerveuses
 - Dissection sur 1,5 cm
 - Section proximale en zone saine
 - Couverture par des tissus sains
 - Section du fléchisseur profond
 - Jamais de suture aux extenseurs
- Effet quadrigé Neu 1985

Fermeture cutanée

- Sans tension
- Un seul plan
- Bon matelassage distal

Deux difficultés :

L'élargissement distal

La stabilité cutanée

Fermeture cutanée

Résection-indentation des oreilles

Buck-Gramcko

Fermeture cutanée

Plastie cutanée dorsale

Voche, Merle

Au niveau de P3

• Faut-il garder la base de P3?

- Risque de résidu unguéal

- Supprimer un moignon de < 5 mm
(Douleurs articulaires)

Gross & Watson

Faut-il garder la base de P3?

Longueur
Force

Au niveau de P2 (doigts longs)

- En aval de l'insertion distale du FCS
 - Conserver le maximum de longueur

- En amont de l'insertion distale du FCS
 - Pas de flexion active IPP

Au niveau de P2 (doigts longs)

Au niveau IPP

- Régularisation osseuse latérale
- Excision distale du cartilage ?
 - Pour :
 - Sensibilité à l'infection
 - Instabilité cutanée
 - Contre :
 - Moins d'hématomes
 - Moins d'infections
 - Pas de spicule osseux distal

Au niveau de P1 (doigts longs)

- Garder le maximum de longueur
- Flexion MP partiellement conservée

Renforcée par un Lasso
autour de P2
(Saffar)

Au niveau de P1 (doigts longs)

Complications

- Névromes douloureux

- Doigt fantôme?

Chu 2000

- Effet lombrical plus

- Effet quadrigé

Prévention des névromes douloureux

- Enfouissement
 - dorsal au dos de P1
 - distal
 - intra-osseux
 - Tunnel oblique
 - canal médullaire
- Auto-sutures distales

Effet lombrical +

- Extension IPP en flexion MP
 - Pas de prévention systématique
 - Section du lombrical secondaire si besoin

Adhérences du moignon de FCP

- Limitation de l'enroulement des doigts voisins
- Douleurs et crampes au poignet et à l'avant-bras
- Perte de force globale, surtout en flexion MP

Traitement par ténolyse du moignon de
FCP

Particularités suivant les rayons

- Rayons centraux :
main incontinente

Particularités suivant les rayons

- Rayons extrêmes : perte de force

Particularités suivant les rayons

Rayons extrêmes : perte de force

Garder le maximum
de longueur

Amputation du pouce : reconstruction souvent indispensable

Allongement

Transfert d'orteil

Pollicisation

Stratégies particulières

- Mélanomes du membre supérieur
(1000 nouveaux cas par an en France)

L'Amputation trans IPP est
suffisante

Park 1992, Heaton

1994

Mais le geste opératoire

s'inscrit dans une
stratégie multi-disciplinaire

Gestes associés à l'amputation

- Perfusion locale

Baas 1989, Muchmore 1990

- Curage lymphatique

Risque d'envahissement ganglionnaire

- Breslow < 0,76 mm : quasi nul
- $0,76 < \text{Breslow} < 1,5$ mm : 5%
- $1,5 < \text{Breslow} < 2,5$ mm : 24%
- Breslow > 4 mm : 36%

Joseph 1998

Détection du ganglion sentinelle dans les stades N0 M0

- Doit être effectué **en peropératoire**
 - 4 à 8 points d'injection autour de la tumeur
- Détection scintigraphique et/ou bleu patent
(20 à 30 mn radio-sonde portable)

Alex 1993

Albertini 1996

Gennari 2000

- Etude histologique du ganglion identifié

- Visualisation de 4 ganglions sentinelles axillaires D et G (⇨ ⇩).
- Ganglion de second ordre axillaire D (⇩)

R. Genin

Après l'amputation

- Rééducation
- Désensibilisation
- Reprise des activités

Fisher GT, Boswick 1983